

## ► Dentiste Neuilly-sur-Seine

Cabinet dentaire du Docteur Michel Becker

📍 10 Rue Louis Philippe 92200 Neuilly sur Seine

☎ Tel. : +33 1 47 45 25 32

🌐 dr-becker-michel.chirurgiens-dentistes.fr

# Qu'est-ce que le surfaçage ?

En complément du détartrage, ce traitement permet d'assainir la gencive en profondeur et de limiter le déchaussement des dents.

## POURQUOI RÉALISER UN SURFAÇAGE ?

En cas de maladie parodontale non soignée, l'infection se propage aux tissus profonds atteignant l'os, créant ainsi des poches parodontales.

L'objectif est de désinfecter les tissus et de permettre leur fermeture par une ré-adhésion de la gencive sur la surface de la dent.

Lorsque le surfaçage ne suffit pas à stabiliser la parodontite, d'autres thérapeutiques, notamment chirurgicales (lambeaux d'assainissement), peuvent alors être envisagées.

“ Le surfaçage permet d'éliminer le tartre et la plaque dentaire des surfaces de la dent, notamment au niveau de la racine. ”



## COMMENT RÉALISE-T-ON UN SURFAÇAGE ?

- Le nombre de séances proposées varie en fonction de la gravité de la parodontite et des dents atteintes.
- Les bactéries et le tartre se sont accumulés sous la gencive en quantité importante. Ils sont retirés après une anesthésie locale.
- Pour parfaire la désinfection sous-gingivale, le surfaçage peut être suivi d'une irrigation des poches parodontales à l'aide d'antiseptiques.

## À SAVOIR

Après un surfaçage, il est possible de constater une légère rétraction de la gencive. Ce phénomène est normal. Il est lié à la guérison de la gencive qui devient moins gonflée du fait de la disparition de l'inflammation et de l'infection.

Cette rétraction de la gencive est parfois associée à une augmentation transitoire de la sensibilité des dents au chaud et au froid qui s'estompera spontanément en quelques semaines. Elle peut être atténuée par l'utilisation de dentifrices pour dents sensibles.